


DIAGNOSTIC DU DIABÈTE DE TYPE 1 : CONNAISSANCES ET PRATIQUES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET DES PHARMACIENS

DES RECOMMANDATIONS DE PRISES EN CHARGE NON ATTEINTES



45 % **56 %**

DES PHARMACIENS

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

DÉCLARENT QUE LE DIAGNOSTIC DU DT1 PEUT ÊTRE RÉALISÉ SUR UNE BANDELETTE URINAIRE OU UNE MESURE DE LA GLYCOSURIE

26 % **37 %**

DES PHARMACIENS

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

AFFIRMENT QU'IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÊTRE À JEUN POUR RÉALISER UNE MESURE DE LA GLYCÉMIE



30 % DES PHARMACIENS ET **26 %** DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES CONFIRMENT QU'UNE GLYCÉMIE > 200 MG/DL QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE LA JOURNÉE DÉFINIT UN DIAGNOSTIC DE DT1



7 PHARMACIENS SUR 10

&



6 MÉDECINS GÉNÉRALISTES SUR 10

DÉCLARENT ORIENTER VERS LES URGENCES DEVANT LES SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES DU DT1

69 %

DES PHARMACIENS

80 %

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

SONT INFORMÉS DU POSSIBLE DIAGNOSTIC DE DT1 CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS



LES 3 SIGNES ÉVOCATEURS DU DT1

ENVIE FRÉQUENTE D'URINER



SOIF INTENSE

RETOUR DU PIPI AU LIT

LES RECOMMANDATIONS DE DIAGNOSTIC DU DT1

- Une mesure de la glycémie sur bandelette glycémique ou de la glycosurie sur bandelette urinaire, au cabinet, suffisent
- Une glycémie > 200 mg/dl ou une glycosurie positive, associée aux symptômes, sont les critères de diagnostic de DT1
- Une orientation immédiate vers les urgences s'impose

ENSEMBLE, DIAGNOSTIQUONS PLUS TÔT LE DIABÈTE DE TYPE 1 !

VOUS ÊTES PARENT OU AIDANT :

- CES SIGNES DOIVENT VOUS ALERTER
- PARLEZ-EN À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

VOUS ÊTES MÉDECIN OU PHARMACIEN :

- SOYEZ ATTENTIF AUX SIGNES ÉVOQUÉS PAR LES FAMILLES
- PRATIQUEZ AU CABINET UNE BANDELETTE URINAIRE OU GLYCÉMIQUE
- DEVANT UN CRITÈRE DIAGNOSTIC, ORIENTEZ VERS LES URGENCES LES PLUS PROCHES



(1) Baromètres B3TSI – Omnibus B3santePro pour l'AJD « Perception et connaissances des médecins généralistes et des pharmaciens du diabète de type 1 des enfants et adolescents de moins de 15 ans », vague 2, décembre 2024, réalisée du 16 au 18 décembre 2024, auprès de 100 médecins généralistes et 100 titulaires d'officine représentatifs en termes de genre, d'âge et de région et représentatifs des officines françaises en termes de genre, d'âge du titulaire et de région d'implantation de l'officine.

(2) Baromètres B3TSI – Omnibus B3santePro pour l'AJD « Perception et connaissances des médecins généralistes et des pharmaciens du diabète de type 1 des enfants et adolescents de moins de 15 ans », vague 1, juin 2024, réalisée du 24 au 25 juin 2024, auprès de 100 médecins généralistes et de 100 titulaires d'officine représentatifs en termes de genre, d'âge et de région et représentatifs des officines françaises en termes de genre, d'âge du titulaire et de région d'implantation de l'officine.

WWW.AJD-DIABETE.FR